

ALGESIC® RHUME

Paracétamol 500mg / caféine 25mg / phényléphrine 5mg



Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Ce médicament est disponible sans prescription mais vous devez cependant utiliser ALGESIC® RHUME comprimé pelliculé avec précaution pour obtenir les meilleurs résultats.

- Gardez cette notice vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à votre pharmacien.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

1. COMMENT AGIT ALGESIC® RHUME COMPRIME PELLICULE ?

ALGESIC® RHUME comprimé pelliculé produit un soulagement efficace des principaux symptômes du rhume et de la grippe. Ces symptômes incluent les maux de tête, les frissons, les douleurs, la congestion nasale et les douleurs sinuiales, les maux de gorge et la fatigue.

Ce médicament contient deux ingrédients actifs :

- Le paracétamol est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrétique (réduit la température lorsque vous avez de la fièvre).
- Le chlorhydrate de phényléphrine dégage votre nez et vos sinus et vous permet de mieux respirer.

La caféine est présente comme stimulant modéré et soulage la fatigue et l'asthénie.

2. A VÉRIFIER AVANT DE PRENDRE ALGESIC® RHUME COMPRIME PELLICULE ?

Ne pas prendre ALGESIC® RHUME comprimé pelliculé

- Si vous avez déjà eu une réaction allergique au paracétamol, à la caféine, au chlorhydrate de phényléphrine ou à l'un des excipients listés en paragraphe 6.
- Si vous avez des problèmes au niveau des reins ou du foie, du diabète, de l'hypertension ou une maladie cardiaque.
- Si votre thyroïde est hyperactive,
- Si vous souffrez de phéochromocytome ou de glaucome.
- Si vous prenez des antidépresseurs tricycliques (imipramine ou amitriptyline), si vous prenez ou avez pris des inhibiteurs de la monoamine oxydase depuis moins de 2 semaines (moclobémide) prescrits pour la dépression,
- Si vous prenez des bêta-bloquants (aténolol).

Ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, des médicaments pour le rhume ou la grippe ou des décongestionnants.

Précautions particulières

Ce médicament peut provoquer des étourdissements. Si cela se produit, ne pas conduire et ne pas manipuler de machines.

Demandez à votre médecin avant de prendre ce médicament, si vous souffrez :

- de maladie vasculaire telle que la maladie de Raynaud
- d'hypertrophie de la prostate
- de maladie cardiaque ou circulatoire.

Si vous prenez d'autres médicaments

Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre ALGESIC® RHUME comprimé pelliculé si vous prenez des médicaments prescrits, en particulier : métoclopramide (pour les nausées) ou dompéridone (pour les vomissements), ergotamine et méthylsergide (pour la migraine), ou coléstyramine (pour diminuer le cholestérol sanguin) ou médicaments pour diminuer la pression sanguine, modérateurs ou stimulants de l'appétit, médicaments pour traiter la dépression tels que antidépresseurs tricycliques (comme l'amitriptyline), les maladies cardiaques (comme la digoxine) ou des médicaments pour fluidifier le sang (anticoagulants comme la warfarine).

Grossesse et allaitement

À cause de la présence de caféine dans ce médicament, il ne devrait pas être utilisé si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

3. COMMENT PRENDRE ALGESIC® RHUME COMPRIME PELLICULE ?

Adulte et enfant âgé de 12 ans et plus :

- Avaler 2 comprimés toutes les 4 heures, si nécessaire.
- Ne pas prendre plus de 8 comprimés par 24 heures.
- Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.
- Ne pas dépasser la dose recommandée.
- Ne pas prendre ce traitement plus de 7 jours sans avis médical.
- Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
- Éviter de consommer trop de caféine (café, thé et certains sodas).
- L'utilisation excessive de caféine peut engendrer des difficultés d'endormissement, des tremblements et une sensation d'inconfort dans la poitrine.

Si vos symptômes persistent, consultez un médecin.

Si vous avez pris trop de comprimés

En cas de surdosage, prévenir immédiatement un médecin, même si vous vous sentez bien car il y a des risques de lésions tardives du foie.

4. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, ALGESIC® RHUME comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Arrêtez la prise du médicament et prévenez votre médecin si vous avez :

- Des réactions allergiques qui peuvent être graves comme une éruption cutanée et des démangeaisons avec parfois un gonflement de la bouche ou du visage,
- Une éruption cutanée ou une desquamation de la peau ou des ulcères buccaux,
- Des difficultés respiratoires : possibles si vous avez déjà eu ces difficultés après la prise de médicaments calmant la douleur comme l'aspirine ou l'ibuprofène,
- Des ecchymoses et saignements inexpliqués,
- Des nausées, une perte de poids soudaine, perte de l'appétit ou un jaunissement des yeux et de la peau,
- Des perturbations visuelles : elles sont rares et sont plus probables chez les patients souffrant de glaucome,
- Un pouls inhabituellement rapide ou une sensation inhabituelle de battements cardiaques rapides ou irréguliers,
- Des difficultés de miction : plus particulièrement chez les patients souffrant d'hypertrophie de la prostate.

Ces réactions sont rares.

Les effets indésirables suivants peuvent se produire. Parlez-en à votre médecin si vous les présentez :

- Augmentation de la pression sanguine, maux de tête, étourdissements, difficultés d'endormissement, diarrhées ou sensation de malaises.

Si vous présentez un effet indésirable, même non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ALGESIC® RHUME COMPRIME PELLICULE ?

• Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

• Conserver à une température ne dépassant pas 25°C et loin de la lumière. Ne pas utiliser ALGESIC® RHUME comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur l'emballage. La date de péremption se réfère au dernier jour du mois.

• Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Substances actives : chaque comprimé contient : paracétamol 500 mg, caféine 25mg, phényléphrine chlorhydrate 5mg.

Autres ingrédients :

Noyau : amidon de maïs pré-gélatinisé, povidone, carboxyméthylamidon sodique type A, stéarate de magnésium.

Pelliculage : polyvinyl alcool, dioxyde de titane, talc, macrogol, lake indigo carmine, lake aluminique du jaune de quinoleine.

Excipients à effet notoire : sans objet

ALGESIC® RHUME 500 mg/25mg/5mg

Boîte de 16 comprimés pelliculés

AMM N°

Ceci est un médicament

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Il vous concerne vous et votre santé.
- Un médicament est un produit actif. Une longue recherche a permis de découvrir son activité. Mais son absorption n'est pas toujours sans danger.
- Il ne faut jamais abuser des médicaments.
- Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.
- Votre pharmacien connaît les médicaments, suivez ses conseils.
- N'utilisez pas les médicaments de façon continue sans avis médical.
- Il ne s'agit pas pour vous de prendre beaucoup de médicaments.
- Il s'agit de prendre les médicaments dont vous avez besoin.





الجزيك زكام

براسيتامول 500 ملغ / كافيين 25 ملغ / فانيليفيرين 5 ملغ

D151571

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل استخدام هذا الدواء. هذا الدواء متوفر بدون وصفة طبية ولكن يجب عليك استخدام الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة باحتياط للحصول على أفضل النتائج. حافظ على هذه النشرة قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أو إذا لم تفهم شيئا، اسأل الصيدلي.

هذا الدواء يحتوي على الباراسيتامول. أدوية أخرى تحتوي عليه. لا تجمعوا بينها، لكي لا تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها.

1. كيف يعمل الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة ؟

الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة مسكن فعال للأعراض الرئيسية للزكام والأنفلونزا. وتشمل هذه أعراض الصداع، القشعريرة والالام، احتقان الأنف والام الجيوب الأنفية، التهاب الحلق والتعب. هذا الدواء يحتوي على اثنين من العناصر النشطة : الباراسيتامول هو مسكن (يسكن الالم) ومخفض للحرارة (يخفض درجة الحرارة حين تكون لديك حمى) - هيدروكلوريد فينيليفيرين لإزالة احتقان الأنف والجيوب الأنفية ويسمح لك بالتنفس بشكل أفضل. الكافيين موجود كمحفز معتدل ويخفف من التعب والوهن.

2. يجب التحقق قبل تناول الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة

عدم تناول الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة: إذا كان لديك سابقا حساسية للباراسيتامول أو الكافيين، وهيدروكلوريد فينيليفيرين أو أي من السواغات المذكورة في الفقرة 6 إذا كان لديك مشاكل على مستوى الكلى أو الكبد، مرض السكري وارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب. إذا كان لديك فرط نشاط الغدة الدرقية إذا كنت تعاني من ورم الغوادم أو مرض الزرق (الأميترينيتلين)، إذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (الامبيرامين أو إذا كنت تأخذ أو أخذت مثبطات مؤكسد احادي الامين منذ أقل من 2 أسابيع (مولوكوبيميد) الموصوفة للاكتئاب - إذا كنت تتناول محصرات بيتا (اتينولول) لا تتناول أدوية أخرى تحتوي على الباراسيتامول، أدوية للزكام أو الأنفلونزا أو مزيلات الاحتقان.

احتياطات خاصة:

قد يسبب هذا الدواء الدوخة. إذا حدث هذا، يجب عدم السياقة واستعمال الآلات. اسأل طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من : - أمراض الأوعية الدموية مثل مرض رينود - تضخم البروستات - أمراض القلب أو الدورة الدموية.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى

اطلب رأي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة إذا كنت تتناول أدوية بوصفة طبية، وخاصة : ميتوكلوبراميد (للغثبان) أو دومبيريدون (للغثبان)، الإرغوتامين والميثيلسرجيد (للمساعد النصفى)، أو الكولسترامين (لخفض كوليسترول الدم) أو أدوية لخفض ضغط الدم، منظمات أو محفزات الشهية، أدوية علاج الاكتئاب مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مثل الأميترينيتلين)، وأمراض القلب (مثل النيجوكسين) أو الأدوية المسيلة للدم (مضادات التخثر مثل الوارفارين).

الحمل والرضاعة

بسبب وجود مادة الكافيين في هذا الدواء، فإنه لا ينبغي أن يستخدم إذا كنت حاملا أو مرضعة.

3. كيفية تناول الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة

البالغين والأطفال الذين يزيد عمرهم عن 12 سنة : تناول قرصين (02) كل 4 ساعات إذا لزم الأمر - لا تتناول أكثر من 8 أقرصا خلال 24 ساعة - يجب دائما احترام فاصل زمني من 4 ساعات على الأقل بين الجرعات - لا تتجاوز الجرعة الموصى بها - لا تأخذ هذا العلاج أكثر من 7 أيام دون استشارة طبية - لا يعطى للأطفال الذين يقل سنهم عن 12 سنة - تجنب استهلاك الكثير من الكافيين (قهوة والشاي ويضع المشروبات الغازية) يمكن أن يسبب الإفراط في استهلاك الكافيين صعوبات في النوم، وارتعاش وشعور بالهيق في الصدر. إذا استمرت الأعراض، يجب استشارة الطبيب.

إذا تناولت أقرصا كثيرة في حالة تناول جرعة زائدة يجب إعلام الطبيب فوراً، حتى لو كنت تشعر بانك في حالة جيدة لأن هناك خطر ظهور جروح في الكبد لاحقا.

4. الآثار غير المرغوبة المحتملة

مثل جميع الأدوية، من المحتمل أن تكون للجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة آثار غير مرغوبة، رغم أنه لا يتعرض لها الجميع - توقف عن تناول الدواء، وإخبار الطبيب إذا كان لديك : - تفاعلات حساسية قد تكون خطيرة مثل الطغح الجلدي والحكة مصحوبة أحيانا بتورم في الفم أو الوجه، - طغح جلدي أو تشنير الجلد أو تقرحات في الفم، - صعوبات في التنفس : ممكنة إذا كنت قد تعرضت لهذه الصعوبات بعد تناولك أدوية مسكنة للألم مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين، - كدمات ونزيف غير مبررة - غثيان وفقدان الوزن المفاجئ، فقدان الشهية أو اصفرار العينين والجلد، - اضطرابات بصرية : تكون نادرة ومحتملة لدى المرضى الذين يعانون من الزرق،

5. كيفية حفظ الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة

يحفظ بعيدا عن متناول ونظر الأطفال. - يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية بعيدا عن الضوء، لا يستعمل الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليه في التغليف. التاريخ يشير إلى آخر يوم من الشهر. - لا ينبغي رمي الأدوية في مياه الصرف الصحي أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما ينبغي عمله بالأدوية غير المستعملة. تسمح هذه التدابير بالمحافظة على البيئة.

6. معلومات اضافية

مكونات نشطة : كل قرص يحتوي على : باراسيتامول 500 ملغ، كافيين 25 ملغ، هيدروكلوريد فينيليفيرين 5 ملغ. مكونات أخرى : النواة : نشاء الذرة سابق الهملنة، كروبويدون، كربوكسيمثيل نشاء صوداوي نوع أ، مغزنيوم الستيرات، التليبيس : كحول متعذد الفانيلين، ثاني أكسيد التيتان، طلق، ماركوقول، كارمين نيلى، أصفر الكينولين. سواغات ذات تأثيرات ملحوظة : لا شيء.

الجزيك[®] زكام أقرصا ملبسة.

باراسيتامول 500 ملغ، كافيين 25 ملغ، هيدروكلوريد فينيليفيرين 5 ملغ.

تأشيرة عدد

إن هذا دواء

الدواء ليس مستحضر كغيره من المستحضرات أنه يتعلق بك وبصحتك الدواء مستحضر فعال سمح البحث الطويل باكتشاف مفعوله غير أن استهلاكه لا يخلو دائما من المخاطر لا يجوز أبدا الإفراط في تناول الأدوية لا تستعمل الأدوية إلا بدرجة تامة الصيدلي يعرف الأدوية : اتبع نصائحه لا تستعمل الأدوية بصورة مستمرة دون استشارة الطبيب ليس عليك تناول الكثير من الأدوية عليك تناول الأدوية التي أنت بحاجة لها.

دار الصيدلي
DAR ESSAYDALI

صنع مخابر دار الصيدلي

تعم الرائد الجبوي - 3000 صفاقس - تونس