

ALLERGUS sirop 0.5 mg/ml



Desloratadine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient sérieux ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

FORME ET PRESENTATION

ALLERGUS SIROP 0.5 mg/ml, Flacon de 150 ml avec seringue doseuse graduée 2.5 ml et 5 ml.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

DES LoratADINE 0.5 mg/ml
Soit 2.5 mg par seringue doseuse de 5 ml.

EXCIPIENTS : Saccharose, Sorbitol, Propylèneglycol, Acide citrique anhydre, Benzoate de sodium, Arôme bubble gum, Trisodium citrate dihydraté, EDTA disodique, Unicert yellow 08006-J (E110), Eau purifiée.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antihistaminique antiH1 (code ATC : R06AX27)

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Fabriqué par Les Laboratoires DAR ESSAYDALI
Rue Commandant Béjaoui Cité Ettaieb 3000 Sfax – Tunisie

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Allergus sirop est un médicament contre l'allergie qui ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

Allergus sirop soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (par exemple, le rhume des foins, l'allergie aux acariens) tels que les éternuements, le nez qui coule ou qui démange, les démangeaisons du palais, les yeux qui démangent, qui sont rouges ou larmoyants.

Allergus sirop est également utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire chronique idiopathique tels que les démangeaisons et l'urticaire.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ne prenez jamais Allergus sirop :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la desloratadine, à la loratadine ou à l'un des autres composants contenus dans Allergus sirop, en particulier le colorant E110.

Allergus sirop est indiqué chez l'enfant de 1 à 11 ans, l'adolescent (12 ans et plus) et l'adulte, dont les personnes âgées.

MISES EN GARDE SPECIALES

Faites attention avec Allergus sirop si vous présentez une maladie des reins.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Vous ne devez pas prendre Allergus sirop si vous êtes allergique au colorant E110.

Allergus sirop contient du saccharose et du sorbitol. Si vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Grossesse :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament durant votre grossesse et si vous allaitez.

Si vous êtes, enceinte, l'utilisation d'Allergus sirop n'est pas recommandée.

Allaitement :

Si vous allaitez, la prise d'Allergus sirop n'est pas recommandée.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

A la dose recommandée, Allergus sirop ne rend généralement pas somnolent et ne diminue pas la vigilance. Cependant, très rarement ont été rapportés des cas de somnolence susceptible d'affecter l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Il n'y a pas d'interactions connues d'Allergus sirop avec d'autres médicaments.

Allergus sirop peut être pris pendant ou en dehors des repas.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Saccharose, Sorbitol, Unicert yellow 08006-J (Colorant E110)

ALLERGUS sirop 0.5 mg/ml

Desloratadine



COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie :

Enfants de 1 à 5 ans : prendre 2,5 ml (une seringue doseuse jusqu'à la graduation 2.5 ml ou une 1/2 cuillère de 5ml) de sirop une fois par jour.

Enfants de 6 à 11 ans : prendre 5ml (une seringue doseuse jusqu'à la graduation 5 ml ou une cuillère de 5ml) de sirop une fois par jour.

Adultes et adolescents (12 ans et plus) : prendre 10ml (deux seringues doseuses jusqu'à la graduation 5 ml ou deux cuillères de 5ml) de sirop une fois par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie orale

Avez la dose de sirop, puis buvez un peu d'eau.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :

Vous pouvez prendre ce médicament au moment ou en dehors des repas. Prenez le sirop aussi longtemps que votre médecin vous aura prescrit.

Conduite à tenir en cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise :

Si vous oubliez de prendre votre dose à temps, prenez-la dès que possible, puis continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

Prenez Allergus sirop uniquement comme il vous a été prescrit.

Aucun problème sérieux n'est attendu lors d'un surdosage accidentel. Cependant, si vous avez pris plus d'Allergus sirop que vous n'auriez dû, prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, Allergus sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tous n'y soient pas sujets. Chez la plupart des enfants et adultes, les effets indésirables avec Allergus sirop sont à peu près les mêmes que ceux observés avec une solution ou un comprimé placebo (contenant du sucre). Cependant, les effets indésirables fréquents chez les enfants âgés de moins de 2 ans étaient diarrhée, fièvre et insomnie alors que chez l'adulte, la fatigue, la sécheresse de la bouche et le mal de tête ont été rapportés plus souvent qu'avec un placebo.

Depuis la commercialisation d'Allergus sirop, des cas de réactions allergiques sévères (avec gêne respiratoire, sifflements bronchiques, démangeaisons, plaques d'urticaire et gonflements) et d'éruption cutanée ont été très rarement rapportés. Des cas de palpitations, d'accélération du rythme cardiaque, de douleur d'estomac, de nausées (envie de vomir), de

vomissements, de pesanteur d'estomac, de diarrhées, vertige, somnolence, insomnie, douleur musculaire, d'hallucinations, de crises d'épilepsie, d'agitation avec mouvements corporels augmentés, inflammation du foie et d'anomalies du bilan hépatique sanguin ont aussi été très rarement rapportés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant sérieux, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER ALLERGUS SIROP

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

Ne pas utiliser Allergus sirop après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Prévenez votre pharmacien si vous constatez un changement de l'aspect du sirop.

ALLERGUS Sirop 0.5 mg/ml

Flacon de 150 ml avec seringue doseuse graduée 2.5 ml et 5 ml

AMM N° 9213343

Tableau C

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.