

FONGICIL OVULE

NITRATE D'ECONAZOLE 150 mg



COMPOSITION :

Pour une ovule de 3g :
Nitrate d'éconazole : 150 mg
Excipients: glycérides hémi-synthétiques solides

FORME PHARMACEUTIQUE

Ovule, Boite de 3 unités

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE ANTIFONGIQUE LOCAL

(G: système génito-urinaire).

INDICATIONS:

Ce médicament est indiqué dans le traitement local des mycoses de la vulve et du vagin parfois surinfectées.

CONTRE INDICATIONS:

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie à l'un des composants du produit ou à une substance apparentée. En cas d'utilisation de préservatifs masculins ou de diaphragmes en latex.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES:

Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du traitement d'ensemble. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs favorisant par votre médecin est indispensable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- Ne pas utiliser un savon acide pour l'hygiène locale (l'acidité favorisant la prolifération des champignons) (Cf. conseils pratiques).
- Ce traitement peut entraîner des sensations de brûlures locales et une augmentation des démangeaisons.

Généralement, ces phénomènes cèdent spontanément à la poursuite du traitement si les symptômes persistent au delà de 24 à 48 heures, consultez votre médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Ne pas utiliser avec des produits spermicides (risque d'inactivation)

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE-ALLAITEMENT :

En cas de nécessité, il est possible d'utiliser ce traitement chez la femme enceinte, après avis médical.

Par prudence, il est déconseillé de prendre ce traitement pendant l'allaitement.

POSOLOGIE :

Dans la majorité des cas, 1 ovule le soir au coucher, pendant 3 jours consécutifs.

En cas de mycose rebelle, une seconde cure de 3 ovules peut être nécessaire.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie vaginale.

Introduire profondément l'ovule dans le vagin , de préférence en position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.

Conseils pratiques:

- Toilette avec un savon à pH neutre ou alcalin.
- Afin de ne pas contaminer votre entourage, utilisez votre propre linge de toilette (gant, serviette),
- Votre médecin pourra :
 - * Traiter également votre partenaire sexuel, afin d'éviter qu'il ne vous recontamine.
 - * compléter votre traitement
- porter des sous-vêtements en coton,
- Eviter de porter des tampons internes pendant le traitement.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE:

Le produit doit être administré de préférence le soir au coucher.

EFFETS SECONDAIRES :

Comme tout produit actif , ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : sensation de brûlure locale, démangeaisons sans conséquence et possibilité d'allergie.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI N'EST PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION :

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR, même si le médicament a été conservé dans des conditions recommandées.

Conservez FONGICIL OVULE 150 mg entre 15°C et 30°C, dans son emballage d'origine.

AMM N° : 921.308.1

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.