

ALGESIC EXTRA

Paracétamol 500 mg/caféine 65mg

Très efficace pour soulager la douleur
Fait baisser la fièvre
Doux pour l'estomac



IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Paracétamol.....500 mg
Caféine.....65 mg

Excipients : Amidon de maïs prégélatinisé, Povidone, Carboxyméthylamidon sodique, Stéarate de magnésium, Polyvinyl alcool, Dioxyde de titane, Talc, Macrogol.

FORME PHARMACEUTIQUE

Boîte de 16 comprimés pelliculés, sous plaquettes thermoformées.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

ALGESIC EXTRA est indiqué dans les maladies avec douleur et/ou fièvre, telles que maux de tête, migraine, états grippaux, douleurs dentaires, douleurs rhumatismales et musculaires et règles douloureuses.

Ce médicament contient du paracétamol (antalgique et antipyrétique) et de la caféine qui augmente l'activité antalgique du paracétamol.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Chez les patients présentant une allergie connue au paracétamol ou à l'un des autres composants
- En cas de maladie grave du foie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ce médicament contient du paracétamol et de la caféine.

Ne pas l'associer à d'autres médicaments contenant du paracétamol et de la caféine.

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre ce médicament.

- Ce médicament ne doit pas être utilisé pour calmer la douleur pendant plus de 10 jours ou pour faire baisser la fièvre pendant plus de 3 jours sans avis médical.

Si la douleur ou la fièvre persiste ou s'aggrave, si d'autres symptômes apparaissent, consultez votre médecin.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'effet anticoagulant de la warfarine et des autres coumarines peut être augmenté par un usage prolongé et journalier du paracétamol avec augmentation du risque hémorragique, un usage non régulier n'a aucun effet.

Les effets d'ALGESIC EXTRA comprimés sur le foie peuvent être augmentés avec la prise simultanée de boissons alcoolisées ainsi que de certains médicaments susceptibles de potentialiser le métabolisme d'ALGESIC EXTRA dans le foie (par exemple, les barbituriques et les antidépresseurs tricycliques).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé au cours de la grossesse ou de l'allaitement.

Toutefois il est conseillé de demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans.

ADULTES (à partir de 12 ans)

2 comprimés jusqu'à 4 fois par jour ;

Soit un maximum de 8 comprimés en 24 heures (soit 4g/jour)

Déconseillé pour les enfants de moins de 12 ans.

Renouveler la dose toutes les 4 heures

sans dépasser 4 doses par jour (soit 4g par jour).

Toujours respecter un intervalle de 4 heures entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures au minimum.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson (par exemple eau, jus de fruit, lait).

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

Le surdosage en paracétamol peut altérer gravement le foie.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, arrêter le traitement et prévenir immédiatement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes particuliers.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

Utilisé suivant la posologie recommandée, ALGESIC EXTRA comprimés n'a habituellement aucun effet secondaire.

Toutefois, dans certains cas rares, des réactions cutanées, comme l'urticaire, ont été rapportées.

D'UNE FACON GENERALE, IL EST RECOMMANDE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN EN CAS DE DOUTE, DE SIGNALER TOUT TRAITEMENT EN COURS OU TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS LA NOTICE.

CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C.

ALGESIC EXTRA 500mg/65mg Boite de 16 comprimés

AMM n° : 921.335.3

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS À LA PORTÉE DE MAIN DES ENFANTS.

Fabriqué par les laboratoires **DAR ESSAYDALI**
Rue Commandant Bjaoui - Cité Taieb - 3000 SFAX (Tunisie)

دار الصيدلي
DAR ESSAYDALI



الجزيك إكسترا

براسيتامول 500 مغ / كافيين 65 مغ

فعال جدًا لتسكين الألم
يخفض السخونة
لطيف للمعدة

D15168/3

التعريف بالسّواء :

التّركيبة الكميّة والكميّة :

براسيتامول.....500 مغ

كافيين.....65 مغ

الحمل والإرضاع :

بالإمكان استعمال البراسيتامول، في ظروف الاستعمال الاعتيادية، أثناء فترة الحمل والإرضاع ؛ لكن ينصح باستشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ما هي طريقة استعمال هذا الدواء ؟

مخصّص للكبار والصغار فوق 12 سنة.

المقادير :

الكبار (انطلاقاً من 12 سنة) :

قرصان حتى 4 مرّات في اليوم : أي 8 أقراص كلّ 24 ساعة كحدّ أقصى (4ع/يوم).

لا ينصح باستعماله لدى الأطفال دون 12 سنة.

عند الاقتضاء، جدّد الجرعة كلّ 4 ساعات دون تجاوز 4 جرعات في اليوم (أي 4ع/يوم). يجب دائماً مراعاة فترة 4 ساعات بين الجرعات.

سواغات : نشاء الذرة سابق الهلئنة، بوفيدون، كروسكارميّلوز صودي، ستيرات المغنزيوم، كحول متعدد فانييل، ثاني أوكسيد التيتان، تالك، ماكروبول.

التقديم : علية من 16 قرص ملتبس يقطع

الصنف الصيدلي - العلاجي : مسكّن للألم / مقاوم للحرارة.

في أي الحالات ينبغي استعمال هذا الدواء :

(الاستعمالات العلاجية)

يوصى باستعمال الجزيك إكسترا لعلاج الأمراض المصاحبة بالألم و/أو السخونة، كالصداع والصداع النصفي والحالات الإنفلونزية وآلم الأسنان وآلم الروماتزمي وآلم العضلات والعادة الشهرية المولمة.

يحتوي هذا الدواء على البراسيتامول (مسكن للألم ومقاوم للسخونة) وعلى مادة الكافيين التي تزيد نشاط البراسيتامول المسكن للألم.

في أي الحالات يحظر استعمال هذا الدواء :

(مضادات الاستعمال)

لا يجوز استعمال هذا الدواء في الحالات التالية :

- لدى المرضى الذين يعانون من حساسية معروفة تجاه البراسيتامول أو أحد مكونات القرص الأخرى.
- في حال المرض الكبدية الحادة.

احتياطات الاستعمال :

- يحتوي هذا الدواء على براسيتامول. لا يجوز إشراكه بأدوية أخرى تحتوي على البراسيتامول.
- في حال المرض الكبدية أو الكلوي الحادة، يلزم استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء لتسكين الألم أكثر من 10 أيام أو لتخفيض السخونة أكثر من 3 أيام دون استشارة الطبيب.
- لا تعطه لطفل أكثر من 3 أيام دون استشارة الطبيب.
- إذا استمرّ أو تفاقم الألم أو السخونة، إذا ظهرت أعراض أخرى، يجب استشارة الطّبيب.

التفاعلات بين الأدوية و تفاعلات أخرى :

قد يزيد تأثير الورفاين والكمبارينات الأخرى المضادّة للتخثر بسبب الاستعمال الطويل واليومي للبراسيتامول، مع زيادة خطر النزيف ؛ الاستعمال غير المنتظم ليس له أي تأثير .

قد تزيد تأثيرات أقراص الجزيك إكسترا على الكبد بسبب تناول المّزّامن لمشروبات كحولية وكذلك لبعض الأدوية التي من شأنها تنشيط استقلاب البراسيتامول في الكبد (مثلاً، الباربيتيوريك ومضادات الاكتئاب الثلاثية الدّورة).

في حال المرض الكلوي الحاد (قصور كلوي حاد)، يجب المبادعة بين الجرعات بمقدار 8 ساعات على الأقل.

كيفية وطريقة الإستعمال :

عن طريق الفم. تبلع الأقراص كما هي مع شراب (مثلاً ماء، عصير فاكهة، حليب).

التأثيرات غير المرغوبة والمزعجة :

بصورة عامة، لا ينجم عن استعمال الجزيك إكسترا حسب المقادير الموصى بها أي تأثير ثانوي.

لكن في بعض الحالات النادرة، سجلت ردود فعل جلدية، مثل الشرى.

ما يجب عمله في حال الجرعة المفرطة :

الجرعة المفرطة من البراسيتامول قد تصدّر الكبد بصورة خطيرة. في حال الجرعة المفرطة أو التناول خطأ لجرعة مفرطة. يجب إيقاف العلاج وإشعار الطبيب على الفور، حتى ولو لم تكن أعراض الجرعة المفرطة ظاهرة.

بصورة عامة، ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي في حال الشك، وإعلامه بكلّ علاج آخر قيد الإجراء أو بكلّ تأثير غير مرغوب ومزعج غير مذكور في هذه النشرة.

الحفظ :

يحفظ في حرارة أدنى من 25م°

الجزيك إكسترا علية من 16 قرصاً ملتبساً يقطع

دواء مصرّح له تحت الرقم 921.335.3

صنع مخابو دار الصيدلي

مُخج الرائد البجاوي - صفاقس - تونس

-	الدواء مستحضر وليس كغيره من المستحضرات
-	الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر
-	احترم بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك
-	اتبع نصائح الصيدلي
-	الطبيب والصيدلي عليان بالدواء وينفعه وضرره
-	لا تقطع مدّة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
-	لا تعد ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.
-	لا تترك الأدوية أبداً في متناول الأطفال