

# MEPRAZOL®

*Oméprazole 20 mg, Pellets gastro-résistantes en gélule*



**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## DANS CETTE NOTICE :

1. Qu'est-ce que MEPRAZOL® 20 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule ?
3. Comment prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MEPRAZOL® 20 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE MEPRAZOL® 20 MG, GÉLULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A02BC01

MEPRAZOL® 20 mg, gélule contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

MEPRAZOL® 20 mg, gélule est utilisé pour traiter les affections suivantes :

#### Adultes :

- Traitement des ulcères duodénaux.
- Prévention des récurrences d'ulcères duodénaux.
- Traitement des ulcères gastriques.
- Prévention des récurrences d'ulcères gastriques.
- En association à des antibiotiques appropriés, éradication de *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) dans la maladie ulcéreuse gastro-duodénale.
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
- Prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque.
- Traitement de l'œsophagite par reflux.
- Traitement d'entretien des patients après cicatrisation d'une œsophagite par reflux.
- Traitement du reflux gastro-œsophagien symptomatique.
- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

#### Utilisation pédiatrique :

- Enfants à partir d'un an et ≥ à 10 kg
- Traitement de l'œsophagite par reflux.
- Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien.
- Enfants de plus de 4 ans et adolescents
- En association à des antibiotiques, traitement de l'ulcère duodénal consécutif à une infection par *H. pylori*.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MEPRAZOL® 20 MG, GÉLULE ?

### Ne prenez jamais MEPRAZOL® 20 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés à la rubrique 6).
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabéprazole, ésoméprazole).
- Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).
- Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas MEPRAZOL® 20 mg, gélule. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule.

MEPRAZOL® 20 mg, gélule peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commenciez à prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :

- Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes à avaler.
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.
- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.
- Vous avez des selles noires (teintées de sang).
- Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'oméprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.
- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.
- Si l'un d'eux est déjà arrivé de développer une réaction cutanée après un traitement avec un médicament similaire à MEPRAZOL® qui réduit l'acidité de l'estomac.
- Vous devez faire un examen sanguin spécifique (Chromogranine A).

Si vous prenez MEPRAZOL® 20 mg, gélule au long-cours (durée supérieure à un an), votre médecin vous surveillera probablement de façon régulière. Vous devez définir précisément tous les symptômes et événements nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que MEPRAZOL® 20 mg, gélule, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier dans les zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que vous le pouvez, car vous devez peut-être arrêter votre traitement avec MEPRAZOL®. Rappelez-vous de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

#### Effets

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que cela ne soit pas recommandé. Ne donnez pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou <10kg.

### Autres médicaments et MEPRAZOL® 20 mg, gélule :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela concerne également les médicaments que vous achetez sans ordonnance.

MEPRAZOL® 20 mg, gélule peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur MEPRAZOL® 20 mg, gélule.

Vous ne devez pas prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Kétoconazole, itraconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques)
- Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques)
- Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire);
- Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de MEPRAZOL® 20 mg, gélule
- Médicaments anti-coagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K ; une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de MEPRAZOL® 20 mg, gélule
- Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose)
- Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH)
- Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe)
- Millepertuis (*Hypericum perforatum*) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée)
- Cilostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente)
- Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH)
- Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang(thrombus))
- Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer).
- Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) – si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par MEPRAZOL® 20 mg, gélule.

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec MEPRAZOL® 20 mg, gélule pour le traitement d'un ulcère à *Helicobacter pylori*, il est important que vous informiez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

### MEPRAZOL® 20 mg, gélule avec les aliments et boissons

Voir rubrique 3.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. L'oméprazole est excrété dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il y ait une influence sur l'enfant lorsqu'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule pendant l'allaitement.

### Sportifs

Sans objet.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

MEPRAZOL® n'est pas susceptible d'entraîner des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Des effets secondaires tels qu'un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire (voir rubrique 4). Si c'est le cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines. L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose/isomaltase (maladies héréditaires rares).

## 3. COMMENT PRENDRE MEPRAZOL® 20 MG, GÉLULE ?

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

### Posologie

Les doses recommandées sont :

#### Adultes

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitation acide :

- Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.
- La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 2 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.
- Si l'ulcère n'a pas été complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 4 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.
- Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

Prévention de la récurrence de l'ulcère duodénal ou gastrique :

- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.

Traitement de l'ulcère duodénal et gastrique provoqué par des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Prévention des ulcères du duodénum et de l'estomac si vous prenez des AINS :

# MEPRAZOL®

**Oméprazole 20 mg, Pellets gastro-résistantes en gélule**



• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.  
**Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par *Helicobacter pylori* :**  
 • La dose recommandée est de 20 mg de MEPRAZOL®, gélule deux fois par jour pendant une semaine.  
 • Votre médecin va vous prescrire en même temps deux antibiotiques parmi l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole.

**Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)**  
 • La dose recommandée est de 60 mg par jour.  
 • Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décidera également de la durée pendant laquelle vous prendrez le médicament.

#### Utilisation chez les enfants et adolescents :

**Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitations acides.**

Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 10 kg peuvent prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule. La posologie dépendra du poids de l'enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.

**Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par *Helicobacter pylori*.**

• Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule. La posologie dépendra du poids de l'enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.  
 • Votre médecin prescrira à votre enfant deux antibiotiques en même temps : l'amoxicilline et la clarithromycine.

#### Posologie

• Il est recommandé de prendre vos gélules le matin.  
 • Les gélules peuvent être prises avec de la nourriture ou à jeun.  
 • Elles doivent être avalées entières avec un demi-verre d'eau. Les gélules ne doivent pas être mâchées ni croquées car elles contiennent des granules pelliculés ce qui empêche le médicament d'être détruit par l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas détériorer les granules.

#### Que faire si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler les gélules

Si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler vos gélules:  
 • Ouvrir la gélule et avaler le contenu directement avec un demi-verre d'eau ou mettre le contenu dans un verre d'eau non gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme ou ananas) ou dans de la compote de pomme.  
 • Toujours remuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.  
 • Pour s'assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne pas les mâcher ni les croquer.

**Si vous avez pris plus de MEPRAZOL® 20 mg, gélule que vous n'auriez dû**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.  
**Si vous oubliez de prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule**  
 Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule**  
 N'arrêtez pas de prendre MEPRAZOL® sans avis au préalable de votre médecin ou pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre MEPRAZOL® 20 mg, gélule et contactez immédiatement un médecin :**

• Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).  
 • Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique.  
 • Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.  
 • Les autres effets indésirables sont :

**Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)**  
 • Maux de tête.  
 • Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.  
 • Nausées ou vomissements.

**Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)**

• Gonflement des pieds et des chevilles.  
 • Troubles du sommeil (insomnie).  
 • Étourdissements, fourmillements, somnolence.  
 • Vertiges.  
 • Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.  
 • Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.  
 • Malaise général, manque d'énergie.

**Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)**

• Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses ou faciliter la survenue d'infections.  
 • Réactions allergiques, parfois très graves incluant le gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, de la fièvre, une respiration sifflante.  
 • Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.  
 • Agitation, confusion ou dépression.  
 • Troubles du goût.  
 • Troubles de la vue, tels que vision trouble.  
 • Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).  
 • Sécheresse buccale.  
 • Inflammation de l'intérieur de la bouche.  
 • Infection appelée « muguet » qui peut affecter l'intestin et est causée par un champignon.

• Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue.  
 • Perte de cheveux (alopécie).  
 • Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.  
 • Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).  
 • Problèmes rénaux sévères (néphrite interstitielle).  
 • Augmentation de la sueur.

**Effets indésirables très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)**

• Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).  
 • Agressivité.  
 • Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives.  
 • Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.  
 • Apparition soudaine d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamations importantes de la peau pouvant être associées à une fièvre importante et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique).  
 • Faiblesse musculaire.  
 • Gonflement des seins chez l'homme.

**Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut être estimée à partir des données disponibles).**

• Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées)  
 • Si vous prenez MEPRAZOL® 20 mg, gélule pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium.  
 • Eruption cutanée, éventuellement avec des douleurs dans les articulations.

MEPRAZOL® 20 mg, gélule peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER MEPRAZOL® 20 MG, GÉLULE ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte ou l'étiquette du flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.  
 A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.  
 Conserver le flacon soigneusement fermé à l'abri de l'humidité.  
 Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

**Ce que contient MEPRAZOL® 20 mg, gélule**  
**La substance active est :** l'oméprazole. Une gélule contient 20 mg d'oméprazole.

#### Les autres composants sont :

Sugar Spheres, Sodium laurilsulfate, Anhydrous disodium phosphate, Mannitol, Hypromellose, Macrogol 6000, Talc, Polysorbate 80, Titanium dioxide, Méthacrylic Acid-Ethyl Acrylate Copolymer.

#### Composition de l'enveloppe de la gélule :

Titane dioxyde, Jaune de quinoléine, Indigotine, Gélatine.

#### Qu'est-ce que MEPRAZOL® 20 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur

Les gélules de MEPRAZOL® 20mg, gélule ont un corps bicolore opaque (tête verte et corps jaune) contenant des microgranules de forme sphérique et de couleur blanche à blanchâtre. Flacons de 7, 14 et 28 gélules (PEHD).

MEPRAZOL® 20 mg Flacon de 7 gélules : AMM N° 921.313.3

MEPRAZOL® 20 mg Flacon de 14 gélules : AMM N° 921.313.1

MEPRAZOL® 20 mg Flacon de 28 gélules : AMM N° 921.313.4

Tableau C.

#### Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.  
 - Un médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.  
 - Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.  
 - Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications.  
 - N'arrêtez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS À LA PORTÉE DE MAINS D'ENFANTS.

#### إن هذا دواء

- الدواء ليس مستحضر كغيره من المستحضرات.  
 - الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.  
 - احترم بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.  
 - أتبع نصائح الصيدلي.  
 - الطبيب والصيدلي علمان بالدواء وبنفعه وضرره.  
 - لا تتعاط مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.  
 - لا تعد ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.  
 - لا تترك الأدوية أبدا في متناول الأطفال.

Fabriquée par les laboratoires DAR ESSAYDALI  
 Rue Commandant Bjaoui - Cité Taleb - 3000 SFAX (Tunisie)

دار الصيدلي  
 DAR ESSAYDALI