

# CO-ALGESIC

*Codéine phosphate hémihydrate 30mg/Paracétamol 500mg*



## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

### POSOLOGIE

RÉSERVÉ À L'ADULTE À PARTIR DE 15 ANS.

1 comprimé, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 à 6 heures. Eventuellement, prendre 2 comprimés en une prise en cas de douleur intense, sans dépasser 6 comprimés par jour.

NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACÉTAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE.  
- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS,  
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.  
EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

## MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

VOIE ORALE.

Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau.

## FRÉQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

En général, les prises sont espacées de 6 heures et au minimum de 4 heures.

En cas de douleur persistante, les prises systémiques permettent d'éviter les pics de douleur. En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum.

## DURÉE DU TRAITEMENT

Si la douleur persiste plus de 4 à 5 jours, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

## CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence un médecin.

Les principaux signes du surdosage en codéine sont la somnolence et des difficultés respiratoires.

## CONDUITE A TENIR EN CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE.

N'augmentez pas la dose et respectez le délai entre les prises.

## RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

En cas de traitement prolongé, l'arrêt brutal de ce médicament peut entraîner un syndrome de sevrage.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

**Liés à la présence de codéine :**

Possibilité de :

- Sensation d'endormissement, euphorie, trouble de l'humeur,
- Rétrécissement de la pupille, difficulté à uriner,

- Réaction d'hypersensibilité (démangeaison, urticaire, éruption cutanée étendue),
- Constipation, nausées, vomissement,
- Somnolence, états vertigineux,
- Gènes respiratoires,
- Douleurs abdominales en particulier chez les patients cholécystectomisés (sans vésicule biliaire).

## Liés à la présence de paracétamol :

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avvertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observés : taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C.

## CO-ALGESIC 30mg/500mg

Boîte de 16 comprimés AMM N° 921.336.1

Tableau A

### *Ceci est un médicament*

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS À LA PORTÉE DE MAIN DES ENFANTS.

Fabriqués par les laboratoires **DAR ESSAYDALI**  
Rue Commandant Bijaoui - Cité Taieb - 3000 SFAX (Tunisie)

**دار الصيدلي**  
**DAR ESSAYDALI**

# CO-ALGESIC



*Codéine phosphate hémihydrate 30mg/Paracétamol 500mg*

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### COMPOSITION

Codéine Phosphate hémihydrate.....30 mg  
(soit en codéine : 22,5 mg /comprimé)  
Paracétamol.....500 mg

**Excipients** : Amidon de maïs prégélatinisé, povidone, carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium, métabisulfite de sodium.

### FORME PHARMACEUTIQUE

Boîte de 16 comprimés sécables, sous plaquettes thermoformées.

### CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

ANTALGIQUE PÉRIPHÉRIQUE, ANALGÉSIQUE OPIOÏDE  
(N : système nerveux central).

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

**Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans)**

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. Il est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses qui ne sont pas soulagées par l'aspirine, le paracétamol ou l'ibuprofène utilisé seul.

### ATTENTION !

#### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol et aux autres constituants,
- Maladie grave du foie,
- Chez l'asthmatique,
- Insuffisance respiratoire,
- Allaitement, en cas de traitement au long cours.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin. L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance. Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (Cf. rubrique « Posologie »).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'absorption d'alcool pendant le traitement est déconseillée. Prévenez votre médecin en cas :

- De maladies des reins ou du foie,
- De maladies respiratoires (dont l'asthme),
- D'encombrement bronchique (toux avec expectoration),
- D'opération de la vésicule biliaire.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament doit être évité avec les agonistes-antagonistes morphiniques (buprénorphine, nalbuphine, pentazocine) et avec la consommation d'alcool.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Signaler que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage d'acide urique ou de sucre dans le sang.

### GROSSESSE – ALLAITEMENT

#### Grossesse

Il est possible de prendre ce médicament pendant la grossesse pour un temps bref (quelques jours) et aux doses recommandées.

Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de codéine peut entraîner une toxicité chez le nouveau né.

Par conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce médicament et de ne jamais dépasser la dose préconisée.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

#### Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel.

De trop fortes doses de codéine administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. En cas d'allaitement, en dehors d'une prise ponctuelle, ce médicament est contre-indiqué.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

### LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Métabisulfite de sodium.

### CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

L'attention est appelée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence dus à la présence de codéine dans ce médicament.

Ce phénomène s'atténue après plusieurs prises, il peut être utile de commencer ce traitement le soir. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.