

TENSOPRIL

CAPTOPRIL



Lire attentivement cette notice avant de commencer votre traitement, elle vous indique les recommandations les plus importantes que vous devez savoir à propos de ce médicament.

Identification du médicament :

Ce médicament est disponible en deux dosages :

25 mg et 50 mg .

Forme et composition :

TENSOPRIL 25 mg sous forme de comprimé carré quadriséable dosé à 25 mg de Captopril.

TENSOPRIL 50 mg sous forme de comprimé oblong bisécable dosé à 50 mg de Captopril

Excipients : Lactose - cellulose microcristalline - amidon de maïs - acide palmitique - Talc - silice colloïdale

Présentation :

En Blister aluminium - PVC.

Classe pharmacologique :

Ce médicament appartient à la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC). Il agit principalement sur le système cardio-vasculaire.

Mode et voie d'administration :

Voie orale. Le comprimé est à avaler avec un verre d'eau .

Indications :

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'hypertension. Il est également utilisé dans l'insuffisance cardiaque congestive, souvent en association avec d'autres médicaments. Chez certains malades, captopril est utilisé après un infarctus du myocarde.

- Captopril agit en provoquant une décontraction du système vasculaire, il augmente la perfusion en sang et en oxygène.

Avant de prendre ce médicament :

Ne prenez pas ce médicament si vous :

- Êtes allergique au captopril ou à un autre IEC ou à l'un des composés du médicament

- Êtes enceinte ou projetez de le devenir ou allaitez. Ce médicament ne doit être utilisé chez la femme en âge de procréer qu'en association avec un contraceptif.

- Souffrez de cirrhose hépatique, de maladie cardiaque ou de porphyrie

• Consultez votre médecin en cas de :

- Collagénose comme le Lupus érythémateux disséminé, de sclérodermie, de maladie vasculaire périphérique, d'athérosclérose ou de neutropénie.

- Si vous devez subir une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie

- Hémodialyse utilisant des membranes en polyacrylonitrile (AN69) et durant les aphéreses des lipoprotéines basse densité avec le sulfate de Dextran.

• Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien toute prise de médicament concomitante y compris les produits conseils achetés sans ordonnance. Ceci est particulièrement important si vous prenez :

- Des diurétiques comme le triamterène, amiloride ou spirinolactone.

- Des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'indométacine.

- Immuno-dépresseurs comme l'azathioprine et le cyclophosphamide

- Les compléments nutritionnels contenant du potassium ou sels de potassium

- Des vasodilatateurs comme le minoxidil

- D'autres médicaments comme le clonidine , l'allopurinol, la procaïnamide, le probénécide ou le lithium.

- L'effet de l'insuline et les antidiabétiques oraux peuvent être potentialisés par le Captopril et donner des chocs hypoglycémiques.

• Vertiges, céphalées ou malaises peuvent survenir chez certaines personnes après la première ou la seconde prise de Captopril. Ne pas conduire de véhicule ou de machine si ce médicament provoque ces effets sur vous. Si Captopril provoque chez vous des nausées sévères ou de la diarrhée, consultez votre médecin avant de reprendre ce médicament .

• Votre médecin peut être amené à vous soumettre à une surveillance médicale régulière : contrôle régulier de la tension artérielle et examens biologiques particulièrement pendant les premiers mois de prise de ce médicament. Ceci est particulièrement important si vous êtes âgé ou souffrez de maladie hépatique, ou cardiaque, collagénose, sous immunodépresseurs, allopurinol ou procaïnamide.

TENSOPRIL

CAPTOPRIL

- Ce médicament donne des réactions faussement positives lors de la recherche de l'acétonurie.

Pendant la prise de ce médicament :

- Avalez le comprimé entier avec de l'eau. Lorsqu'une dose plus faible est prescrite les comprimés peuvent être partagés.
- La dose usuelle sera différente en fonction des pathologies et des patients. Toujours prendre le médicament conformément à la prescription médicale. Si vous avez des doutes posez la question à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si vous omettez de prendre une dose de ce médicament, prenez la dose omise dès la prise de conscience. Toutefois, si le rappel survient à la prise suivante, ne tenez plus compte de la dose omise, continuez les prises normalement. Ne doublez pas les doses.
- Si vous pensez avoir pris trop de comprimés, contacter immédiatement votre médecin ou adressez vous à l'hôpital le plus proche. Prenez avec vous les comprimés restants et la boîte qui permettra d'identifier le médicament.

Après la prise de ce médicament :

A côté de son effet recherché, un médicament peut provoquer des effets indésirables. Si l'une des manifestations suivantes apparaît, consultez immédiatement votre médecin ou pharmacien :

- Des réactions allergiques tels que gonflement de la face, des lèvres, des muqueuses, de la langue, du larynx, des troubles de la déglutition ou de la respiration, signes d'infection tels que mal de gorge, fièvre, douleur abdominale, vomissement ou diarrhée (occasionnellement constipation), vertige important ou malaise (hypotension), palpitations inhabituelles ou arythmie cardiaque, jaunissement des yeux ou de la peau peuvent apparaître.
 - Des effets indésirables plus habituels peuvent être accompagnés de démangeaison, fièvre, toux sèche, trouble du goût, perte de poids, mal de tête, fourmillement ou engourdissement des mains, vertige, nausée, fatigue, mal de dos, perturbation du sommeil, nervosité, changement d'humeur, impuissance et perte de cheveux.
- Consultez votre médecin si l'un de ces effets persiste ou devient gênant.
- Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet gênant ou inexpliqué qui ne figure pas dans cette notice

Conservation :

- Ne pas utiliser ce médicament au delà de la date limite figurant sur le conditionnement.
- Conserver dans un endroit sec au dessous de 25°C et à l'abri de la lumière
- Ne pas laisser à la portée des enfants. Ce médicament peut être dangereux pour eux.
- Rappelez-vous, ce médicament a été prescrit pour vous. Ne jamais administrer à une autre personne même si ses symptômes ressemblent aux vôtres.
- Ne gardez pas les comprimés restant dont vous n'avez plus besoin. Ramenez les à votre pharmacien. Ne les gardez que si votre médecin le demande.

Conditions de délivrance :

Ce médicament est inscrit au tableau A. Il est délivré uniquement sur ordonnance.

Tensopril 25 mg boîte de 30 cp : AMM : 921.306.1
Tensopril 25 mg boîte de 375 cp : AMM : 921.306.3H
Tensopril 50 mg boîte de 30 cp : AMM : 921.306.2
Tensopril 50 mg boîte de 300 cp : AMM : 921.306.4H

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر وليس كغيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تعد ولا تزد عليها بدون إستشارة الطبيب
- لا تترك الدواء في متناول أيدي الأطفال

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres,
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



صنعت مخابرات المستحضرات الصيدلانية دار الصيدلي نوح الرائد الجباري - صفاقس - تونس
Fabriqué par Laboratoires DAR ESSAYDALI Rue Commandant Bejaoui Sfax (Tunisie)